

PODSTAWY BIOSTATYSTYKI dla ZB III  
dr inż Krzysztof Bryś

Wykład 1

**Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa.**

**1. Pojęcia wstępne.**

*Doświadczeniem losowym* nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy jedynie informacje o zbiorze możliwych wyników tego doświadczenia. Wynik doświadczenia losowego wykluczający inne możliwe wyniki nazywamy *zdarzeniem elementarnym*.

UWAGA: Zakłada się, że w wyniku doświadczenia losowego zachodzi dokładnie jedno zdarzenie elementarne.

Zbiór wszystkich zdarzeń losowych nazywamy *przestrzenią zdarzeń elementarnych* i oznaczamy przez  $\Omega$ . *Zdarzeniem losowym* nazywamy dowolny wynik doświadczenia losowego. Każde zdarzenie losowe jest zbiorem zdarzeń elementarnych

UWAGA: Jeżeli  $\Omega$  jest zbiorem skończonym lub przeliczalnym, to *zdarzeniem losowym* jest dowolny podzbiór zbioru  $\Omega$

Zdarzenie  $\emptyset$  nazywamy zdarzeniem *niemożliwym*.

Zdarzenie  $\Omega$  nazywamy zdarzeniem *pewnym*.

Zdarzenie  $\bar{A} = \Omega \setminus A$  nazywamy zdarzeniem *przeciwnym* do  $A$ .

Jeżeli dla dwóch zdarzeń  $A$  i  $B$  zachodzi  $A \cap B = \emptyset$ , to mówimy, że zdarzenia te *wykluczają się* (są rozłączne).

**Przykłady.** Zdarzenie  $A = \text{miesiąc kwiecień ma 31 dni}$  jest zdarzeniem niemożliwym. Zdarzenie  $B = \text{miesiąc kwiecień ma 30 dni}$  jest zdarzeniem pewnym. Zdarzeniem przeciwnym do  $C = \text{dzisiaj jest niedziela}$  jest zdarzenie  $\bar{C} = \text{dzisiaj jest inny dzień tygodnia niż niedziela}$ .

**Przykład.** Rozważmy doświadczenie losowe polegające na jednokrotnym rzucie monetą. Przestrzeń zdarzeń elementarnych składa się z dwóch elementów, zdarzenia  $\omega_O$  polegającego na wypadnięciu orła i  $\omega_R$ , które oznacza wypadnięcie reszki. Wypiszmy wszystkie możliwe podzbiory zbioru  $\Omega$  (zdarzenia losowe):

$$A_1 = \Omega = \{\omega_O, \omega_R\}, A_2 = \{\omega_O\}, A_3 = \{\omega_R\}, A_4 = \emptyset.$$

Zdarzenie  $A_1$  polega na wypadnięciu orła lub reszki. Jest to zdarzenie pewne. Zdarzenie  $A_4$  polegające na niewypadnięciu ani orła ani reszki nie może zajść w wyniku naszego doświadczenia losowego. Jest to zdarzenie niemożliwe. Zdarzeniem przeciwnym do  $A_2$  - wypadł orzeł jest zdarzenie  $A_3$  - wypadła reszka. Zwróćmy uwagę na to, że  $A_2 \cup A_3 = \Omega$  (w wyniku rzutu monetą wypadnie orzeł lub reszka) oraz  $A_2 \cap A_3 = \emptyset$  (nie może wypaść jednocześnie orzeł i reszka).

**2. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.**

Niech  $\Omega$  będzie zbiorem skończonym, to znaczy  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ . Dla dowolnego zdarzenia  $A \subseteq \Omega$  takiego, że  $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k}\}$ , gdzie  $i_1, i_2, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, N\}$ , definiuje się funkcję prawdopodobieństwa w następujący sposób:

$$P(A) = P(\{\omega_{i_1}\}) + P(\{\omega_{i_2}\}) + \dots + P(\{\omega_{i_k}\}).$$

W przypadku, gdy zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne, to znaczy  $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_N) = \frac{1}{N}$ , otrzymujemy następujący wzór:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{k}{N} = \frac{\text{liczba zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu } A}{\text{liczba wszystkich zdarzeń elementarnych}}.$$

Powyższa definicja prawdopodobieństwa nie jest poprawna w ogólności, gdyż zbiór  $\Omega$  nie musi być skończony a zdarzenia elementarne nie muszą być jednakowo prawdopodobne.

### 3. Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa.

Niech  $\Omega$  będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych,  $\mathcal{Z}$  zbiorem zdarzeń losowych.

*Funkcją prawdopodobieństwa* nazywamy funkcję  $P : \mathcal{Z} \rightarrow [0, 1]$  spełniającą następujące trzy aksjomaty:

P1)  $P(A) \geq 0$  dla każdego  $A \in \mathcal{Z}$ ,

P2)  $P(\Omega) = 1$

P3) jeżeli  $A_1, A_2, \dots, A_n \dots$  jest ciągiem zdarzeń rozłącznych (to znaczy  $A_i \cap A_j = \emptyset$  dla  $i \neq j$ ), to  $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots$

Wartość funkcji  $P$  na zbiorze  $A$  nazywamy prawdopodobieństwem zdarzenia  $A$

### 4. Własności funkcji prawdopodobieństwa.

1.  $P(\emptyset) = 0$ .

2. Jeśli  $A \subseteq B$ , to  $P(A) \leq P(B)$ .

3. Dla dowolnego  $A \subseteq \Omega$   $P(A) \leq 1$ .

4. Jeśli  $A \subseteq B$ , to  $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ .

5. Dla dowolnego  $A \subseteq \Omega$   $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ .

6.  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .

7. Jeżeli zdarzenia  $A_1, A_2, \dots, A_n$  są parami rozłączne, to  $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ .

### 5. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność.

Prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia  $A$  pod warunkiem, że zaszło zdarzenie  $B$ :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**Doświadczenia niezależne** = dowolny wynik jednego z nich nie wpływa na wynik drugiego.

**Zdarzenia niezależne** = zdarzenia  $A, B$ , dla których:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

albo

$$P(A|B) = P(A) \text{ lub } P(B|A) = P(B)$$

Informacja o zajściu jednego z nich nie zmienia szans wystąpienia drugiego.

### 5. Zupełny układ zdarzeń. Wzór Bayesa

Zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  tworzą *zupełny układ zdarzeń* jeśli:

1.  $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ ,

2.  $A_i \cap A_j = \emptyset$  dla każdego  $i \neq j$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$

### **Twierdzenie o prawdopodobieństwie zupełnym**

Jeśli zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  tworzą zupełny układ zdarzeń, to dla każdego zdarzenia  $B$  :

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)$$

### **Wzór Bayesa**

Jeśli zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  tworzą zupełny układ zdarzeń, to dla każdego zdarzenia  $B$  takiego, że  $P(B) > 0$  oraz dowolnego  $j = 1, 2, \dots, n$  zachodzi wzór :

$$\begin{aligned} P(A_j|B) &= \frac{P(A_j \cap B)}{P(A_1 \cap B) + \dots + P(A_j \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)} = \\ &= \frac{P(A_j) \cdot P(B|A_j)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots + P(A_j) \cdot P(B|A_j) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)} \end{aligned}$$

### **Zmienna losowa jednowymiarowa**

Intuicyjnie: zmienna, która przyjmuje pewną wartość liczbową w wyniku doświadczenia losowego.

Formalnie: Funkcja  $X : \Omega \rightarrow R$  przyporządkowująca każdemu zdarzeniu losowemu pewną wartość liczbową

**Dystrybuanta zmiennej losowej  $X$**  - funkcja  $F_X : R \rightarrow R$  zdefiniowana następująco:

$$F(x) = P(X < x) \text{ dla każdego } x \in R$$

### **Zmienna losowa typu skokowego**

Zmienna  $X$ , dla której zbiór wartości przyjmowanych przez tą zmienną jest skończony lub przeliczalny, tzn  $W_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  albo  $W_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \text{ldots}\}$

**Rozkład prawdopodobieństwa:** funkcja  $P$ , która każdemu **punktowi skokowemu**  $x_i \in W_X$  przyporządkowuje **skok prawdopodobieństwa**  $p_i = P(X = x_i)$  w taki sposób, że:

1) dla każdego  $i$  :  $p_i > 0$  oraz

$$2) \sum_i p_i = 1$$

### **Zmienna losowa typu ciągłego**

Zmienna  $X$ , dla której zbiór wartości przyjmowanych przez tą zmienną jest przedziałem liczbowym lub sumą przedziałów.

**Rozkład prawdopodobieństwa:** funkcja  $f$  zwana **gęstością prawdopodobieństwa** taka, że

1) dla każdego  $x \in R$  :  $f(x) \geq 0$  oraz

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

### **Podstawowe parametry zmiennej losowej**

1. **Wartość oczekiwana** zmiennej losowej  $X$  = liczba  $E(X)$  będąca średnią ważoną rozkładu prawdopodobieństwa przy założeniu, że wagą jest prawdopodobieństwo (dla zmiennej losowej typu skokowego) albo środkiem ciężkości rozkładu prawdopodobieństwa przy założeniu, że gęstością jest funkcja gęstości prawdopodobieństwa (dla zmiennej losowej typu ciągłego).

2. **Wariancja** zmiennej losowej  $X = D^2(X)$  = wartość oczekiwana kwadratu odchylenia zmiennej od jej wartości oczekiwanej - miara średniego odchylenia kwadratowego.

3. **Odchylenie standardowe** zmiennej losowej  $X = D(X)$  = pierwiastek z wariancji - miara średniego odchylenia zmiennej od jej wartości oczekiwanej.

4. **Kwantyl rzędu  $p$**  =  $x_p$  = punkt, w którym skumulowane prawdopodobieństwo (dystrybuanta) osiąga (przekracza) wartość  $p$ .

mediana =  $Me$  = kwantyl rzędu  $\frac{1}{2}$

kwantyl dolny =  $Q_1$  = kwantyl rzędu  $\frac{1}{4}$

kwantyl dolny =  $Q_3$  = kwantyl rzędu  $\frac{3}{4}$

$i$ -ty decyl = przedział między kwantylem rzędu  $(i - 1) \cdot 0.1$  a kwantylem rzędu  $i \cdot 0.1$

$i$ -ty percentyl = przedział między kwantylem rzędu  $(i - 1) \cdot 0.01$  a kwantylem rzędu  $i \cdot 0.01$

5. **Moda (dominanta; wartość modalna)** = punkt, w którym funkcja prawdopodobieństwa osiąga największą wartość.