

1. Rozważmy przestrzeń funkcji z przedziału $(0, 1)$ w zbiór \mathbb{R} . Dla jakich $k \in \mathbb{N}$ układ wektorów $(1, x, x^2, \dots, x^k, \frac{1-x^4}{1+x})$ jest liniowo niezależny? Odpowiedź uzasadnić.

2. Czy przekształcenie $\phi : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ dane wzorem $\phi(w(x)) = ((2x + 1) \cdot w(x) - x^2 \cdot w'(x))'$ jest przekształceniem liniowym. Jeśli tak to podać macierz przekształcenia ϕ w bazie kanonicznej $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$ oraz znaleźć bazy $\text{Ker}\phi$ i $\text{Im}\phi$.

3. Znaleźć bazę $U \cap W$. Rozszerzyć ją do bazy U , następnie do bazy $U + W$, a następnie do bazy całej

przestrzeni. $U = \mathcal{L}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right), W = \mathcal{L}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right).$

4. Znaleźć przekształcenia ψ_1 oraz ψ_2 takie, że $\mathcal{L}([1 \ 2 \ 0 \ 1]^T, [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T) = \text{Ker}\psi_1 \cap \text{Ker}\psi_2$. Czy przekształcenia ψ_1, ψ_2 są wyznaczone jednoznacznie ?

5. Niech V_1, V_2, U będą podprzestrzeniami przestrzeni liniowej V takimi, że $V = V_1 \oplus V_2$, $\dim U = k$, $V_1 + U, V_2 + U$ są sumami prostymi. Wyznaczyć $\dim((V_1 \oplus U) \cap (V_2 \oplus U))$.

1. Rozważmy przestrzeń funkcji z przedziału $(0, 1)$ w zbiór \mathbb{R} . Dla jakich $k \in \mathbb{N}$ układ wektorów $(1, x, x^2, \dots, x^k, \frac{1-x^5}{1-x})$ jest liniowo niezależny? Odpowiedź uzasadnić.

2. Czy przekształcenie $\phi : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ dane wzorem $\phi(w(x)) = (2x \cdot w(x) - (x^2 + 1) \cdot w'(x))'$ jest przekształceniem liniowym. Jeśli tak to podać macierz przekształcenia ϕ w bazie kanonicznej $\mathcal{B} = (1, x, x^2)$ oraz znaleźć bazy $\text{Ker}\phi$ i $\text{Im}\phi$.

3. Znaleźć bazę $U \cap W$. Rozszerzyć ją do bazy U , następnie do bazy $U + W$, a następnie do bazy całej

przestrzeni. $U = \mathcal{L}\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}\right), W = \mathcal{L}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right).$

4. Znaleźć przekształcenia ψ_1 oraz ψ_2 takie, że $\mathcal{L}([-1 \ 2 \ 1 \ 0]^T, [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T) = \text{Ker}\psi_1 \cap \text{Ker}\psi_2$. Czy przekształcenia ψ_1, ψ_2 są wyznaczone jednoznacznie ?

5. Niech V_1, V_2, U będą podprzestrzeniami przestrzeni liniowej V takimi, że $V = V_1 \oplus V_2$, $\dim U = k$, $U + V_1$ jest sumą prostą. Wyznaczyć $\dim((U \oplus V_1) \cap V_2)$.